

THORSTEN SCHMIDT

FINANZMATHEMATIK

15.807,50

+3.158,47 (24,97 %) ↑ in den letzten 6 Monaten

14. Apr., 17:55 MESZ • Haftungsausschluss

1 T. | 5 T. | 1 M. | 6 M. | YTD | 1 J. | 5 J. | Max.



Eröffnung	15.789,78	Tief	15.760,32	52-Wo-Hoch	15.841,47
Hoch	15.841,47	vort. Sch.	15.729,46	52-Wo-Tief	11.862,84

UNIVERSITÄT FREIBURG

Vorwort

Diese Vorlesung ist aus unseren vorigen Vorlesungen entstanden (in Leipzig, Chemnitz und in vorigen Semestern in Freiburg).

Dieses Skriptum ist vorläufig ! Es enthält offensichtlich noch viele Fehler – also bitte mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl lesen. Für Rückmeldungen sind wir natürlich äußerst dankbar und würden uns über eine Email an das Sekretariat Stochastik.

Thorsten Schmidt

Einführung

Beginnen wir unseren Ausflug in die Finanzmathematik mit einem einfachen Beispiel. Natürlich ist dieses Beispiel zu einfach um realitätsnah zu sein, allerdings lassen sich an diesem Beispiel schon viele grundlegende Mechanismen der Finanzmathematik erläutern.

Ein Binomialmodell mit einem Call

Betrachten wir einen Index mit Wert $S_0 = 15.500$. Sie möchten auf steigende Kurse setzen und ziehen den Kauf eines Calls mit Ausübungspreis (Strike) von $K = 15.800$ in Betracht. Als zugrundeliegendes Modell kommen für Sie zwei zukünftige Szenarien in Frage: der Kurs steigt auf 16.000 oder fällt auf 14.000. Hierzu ordnen Sie (subjektiv, oder aus statistischen Methoden) die Wahrscheinlichkeiten $1/3$ und $2/3$ zu. Das führt zu folgendem Modell:

$$S_1(\omega) = \begin{cases} 16.000 & \omega = \omega_1, \\ 15.000 & \omega = \omega_2, \end{cases}$$

wobei S_1 der Wert des zufälligen Aktienkurses (Stock) zur Zeit 1 ist. Die Auszahlung des Calls and 1 ist $C_1 := (S_1 - K)^+ = \max\{S_1 - K, 0\}$, also


$$C_1(\omega) = \begin{cases} 300 & \omega = \omega_1, \\ 0 & \omega = \omega_2. \end{cases}$$

Was wären Sie bereit für dieses Derivat zu bezahlen?

Eine Umfrage unter den Teilnehmern des Kurses gibt einige Angebote in der Nähe von 100. Gehen wir also von einem Angebot von 100 aus¹

Als geschickter Marktteilnehmer kaufe ich den Call und verkaufe gleichzeitig (leer) 0,3 Aktien², den verbleibenden Betrag lege ich auf das Bankkonto. Das ergibt folgende Rechnung:

Call kaufen	-100
Erlös aus Aktienverkauf	4.650
Restgeld auf Konto	4.550



Eine kurze Historie des DAX laut google.com (April 2023)

¹ Überlegen Sie sich: Ist das zu teuer oder zu billig - dann setzen Sie als Marktteilnehmer auf Ihre Einschätzung.

² wieso gerade 0,30?

und alles geht auf. Summe der Ausgaben an $t = 0$ sind 0.

An Zeitpunkt 1 gibt es zwei Möglichkeiten: Angenommen wir beobachten ω_1 . Dann hat das Portfolio folgenden Wert:

Call zahlt aus:	300
0.3 Aktie wird gekauft	-4.800
Restgeld auf Konto	4.550
Erlös	50

Für die Beobachtung von ω_2 erhalten wir folgenden Wert:

Call zahlt aus:	0
0.3 Aktie wird gekauft	-4.500
Restgeld auf Konto	4.550
Erlös	50

In jedem Fall gewinne ich mit dieser Strategie 50, und zwar sicher(!). Der Call war offensichtlich 50 Geldeinheiten zu teuer!

Wie kann man sich sicher sein, dass man solche Bewertungsfehler vermeidet? Dies ist ein Hauptziel dieser Vorlesung. Bemerkenswert auch, dass die Wahrscheinlichkeiten gar keine Rolle spielten! Woher bekomme ich die Anzahl der zu verkaufenden Aktien?

Wir werden noch weitere andere interessante Punkte streifen, unter anderem:

- No-Arbitrage Theorie in diskreter Zeit,
- Hedging,
- Risikomaße und deren Schätzung,
- Modellrisiken,
- Zinsmärkte und affine Modelle,
- Konsistente Kalibrierung,
- Unendlichdimensionale Finanzmärkte.

Finanzmärkte in diskreter Zeit

Ein hervorragendes Buch zu diesem Thema ist das Buch von Hans Föllmer und Alexander Schied³ (am besten in der neuesten Edition). Wir folgen zunächst im wesentlichen diesem Buch, beginnen aber gleich mit dem Mehrperiodenmodell.

³ H. Föllmer and A. Schied. *Stochastic Finance*. Walter de Gruyter, Berlin, 2011

Die Unsicherheit über zukünftige Preisentwicklung wird mit einem stochastischen Modell dargestellt. Wie man das genau und am Besten macht, um vor allem Unsicherheiten mit einzubauen ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung. Wir starten deswegen mit dem einfachsten Fall und fixieren einen festen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, \mathcal{F}, P) .

In der Praxis ist P typischerweise nicht bekannt, so dass bereits durch diese Annahme ein *Modellrisiko* entsteht. Manche der Resultate (etwa in einem vollständigen Modell wie dem Binomialmodell) werden sogar unabhängig von P formuliert werden können (genauer: lediglich von den Nullmengen von P abhängig).

Für eine Zufallsvariable X verwenden wir $X \geq 0$ als Abkürzung für $X \geq 0$ P -fast sicher und machen das im Folgenden nicht mehr kenntlich (ebenso natürlich für $=$ und \leq).

Einführung

Ein Finanzmarkt besteht aus $d + 1$ Wertpapieren, welche alle nicht-negative Werte annehmen. Wir modellieren die Preise der Wertpapiere durch stochastische Prozesse. Ein stochastischer Prozess ist eine Familie von Zufallsvariablen - hier in diskreter Zeit zum Beispiel S_0, \dots, S_T , mit einem festen Zeithorizont T . Wir setzen $\mathbb{T} = \{0, \dots, T\}$ wodurch wir die Preisprozesse schreiben können als $S = (S_t)_{t \in \mathbb{T}}$.

Den Preisprozess des i -ten Wertpapiers bezeichnen wir mit

$$S^i = (S_t^i)_{t \in \mathbb{T}}.$$

Das 0-te Wertpapier ist das sogenannte Bankkonto (oder numéraire), und wir nehmen an, dass $P(S_t^0 > 0) = 1$ für alle $t \in \mathbb{T}$.

Die Marktfiltration

Die zur Verfügung stehende Information wird durch eine Filtration $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ beschrieben, das ist eine wachsende Folge von Sub- σ -Algebren von \mathcal{F} . Im Allgemeinen schreiben wir $\bar{S} = (S^0, S)$ für alle $d + 1$ Wertpapiere und $S = (S^1, \dots, S^d)$ für die d Wertpapiere ohne das Bankkonto.

Ein stochastischer Prozess $X = (X_t)_{t=0, \dots, T}$ heißt *adaptiert*, falls X_t \mathcal{F}_t -messbar ist für alle $t = 0, \dots, T$. Ein stochastischer Prozess $X = (X_t)_{t=1, \dots, T}$ heißt *vorhersehbar*, falls X_t \mathcal{F}_{t-1} -messbar ist für alle $t = 1, \dots, T$.


Wir nehmen an, dass die Preise ohne Verzögerung oder zusätzliches Rauschen allen Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden - demnach ist jeder Preisprozess adaptiert. Fassen wir zusammen: Ein Finanzmarktmodell besteht aus

- Einem Bankkonto mit dem adaptierten, positiven Preisprozess S^0
- und d Wertpapieren mit adaptierten, nichtnegativen Preisprozessen S^1, \dots, S^d .

Handelsstrategien

Definition 1. Eine *Handelsstrategie* \bar{H} ist ein vorhersehbarer, $(d + 1)$ -dimensionaler stochastischer Prozess. Sie heißt *selbstfinanzierend*, falls

$$\bar{H}_t \cdot \bar{S}_t = \bar{H}_{t+1} \cdot \bar{S}_t, \quad t = 1, \dots, T - 1.$$



Bei einer selbstfinanzierenden Handelsstrategie wird beim Umschichten des Portfolios kein neues Geld benötigt und der gesamte

Betrag reinvestiert. Wir führen die Notation $\Delta S_k = S_k - S_{k-1}$ für die *Zuwächse* von S ein.

Lemma 2. Für eine selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} und $t \geq 1$ ist

$$\bar{H}_t \cdot \bar{S}_t = \bar{H}_1 \cdot \bar{S}_0 + \sum_{k=1}^t \bar{H}_k \cdot \Delta \bar{S}_k.$$

Beweis. Das sieht man in zwei Schritten:

$$\begin{aligned} \bar{H}_t \cdot \bar{S}_t &= \bar{H}_t \cdot \bar{S}_t + \bar{H}_{t-1} \cdot \bar{S}_{t-1} - \bar{H}_{t-1} \cdot \bar{S}_{t-1} \\ &= \bar{H}_t \cdot \bar{S}_t + \bar{H}_{t-1} \cdot \bar{S}_{t-1} - \bar{H}_t \cdot \bar{S}_{t-1} \\ &= \bar{H}_t \cdot (\bar{S}_t - \bar{S}_{t-1}) + \bar{H}_{t-1} \cdot \bar{S}_{t-1} \\ &= \sum_{k=2}^t \bar{H}_k \cdot (\bar{S}_k - \bar{S}_{k-1}) + \bar{H}_1 \cdot \bar{S}_1 \end{aligned}$$

wobei wir genutzt haben, dass \bar{H} selbstfinanzierend ist. Weiterhin gilt:

$$\begin{aligned} \bar{H}_1 \cdot \bar{S}_1 &= \bar{H}_1 \bar{S}_1 + \bar{H}_1 \cdot \bar{S}_0 - \bar{H}_1 \cdot \bar{S}_0 \\ &= \bar{H}_1 (\bar{S}_1 - \bar{S}_0) + \bar{H}_1 \cdot \bar{S}_0 \end{aligned}$$

und Gleichung (1) ist erfüllt. \square

Beispiel 3 (Bankkonto). Oft betrachtet man das Bankkonto als Numéraire. Dabei ist $(r_t)_{1 \leq t \leq T}$ ein vorhersehbarer Prozess, der den Zins beschreibt. Das Bankkonto startet mit dem Wert $S_0^0 = 1$ und hat an t den folgenden Wert:

$$S_t^0 = \prod_{s=1}^t (1 + r_s).$$

Viele Resultate sind bezüglich diesem speziellen Numéraire definiert. Wir nehmen mindestens an, dass $r_s > -1$ für alle $s = 1, \dots, T$. Typischerweise kann man sogar noch annehmen, dass r vorhersehbar ist und manchmal verlangt man auch nicht-negative Zinsen, also $r \geq 0$. \diamond

Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten macht man vergleichbar, indem man mit einer Referenz *diskontiert*. Wir führen den *diskontierten Preisprozess*

$$X_t^i := \frac{S_t^i}{S_t^0}, \quad t = 0, \dots, T, \quad i = 0, \dots, d$$

ein. Hierbei ist $X_t^0 \equiv 1$ für alle $0 \leq t \leq T$ und die Referenz auf X^0 verschwindet sogar. Starten wir mit einer Handelstrategie \bar{H} , so

nutzen wir die Notation H für den Verweis auf die letzten d Komponenten von H , verwenden also stets die Darstellung $\bar{H} = (H^0, H)$. Dies sieht man insbesondere in der Darstellung des diskontierten Gewinnprozesses.

Definition 4. Der *diskontierte Wertprozess* $V = V^{\bar{H}}$ der Handelsstrategie \bar{H} ist

$$V_t := \bar{H}_t \cdot \bar{X}_t, \quad t = 1, \dots, T$$

und $V_0 := \bar{H}_1 \cdot \bar{X}_0$. Der *diskontierte Gewinnprozess* $G = G^{\bar{H}}$ ist

$$G_t := \sum_{k=1}^t H_k \cdot \Delta X_k, \quad t = 1, \dots, T$$

mit $G_0 = 0$.

Da $X_k^0 - X_{k-1}^0 = 0$ ist, folgt für alle $0 \leq t \leq T$, dass

$$G_t = \sum_{k=1}^t \bar{H}_k \cdot \Delta \bar{X}_k.$$

Weiterhin ist

$$V_t = \bar{H}_t \cdot \bar{X}_t = \frac{\bar{H}_t \cdot \bar{S}_t}{S_t^0}.$$

Satz 5. Sei \bar{H} eine Handelsstrategie. Dann sind äquivalent:

- (i) \bar{H} ist selbstfinanzierend,
- (ii) $\bar{H}_t \cdot \bar{X}_t = \bar{H}_{t+1} \cdot \bar{X}_t, \quad t = 1, \dots, T-1,$
- (iii) $V_t = V_0 + G_t$ für $0 \leq t \leq T$.

Beweis. \bar{H} ist selbstfinanzierend,

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad & \bar{H}_t \cdot \bar{S}_t = \bar{H}_{t+1} \cdot \bar{S}_t \quad t = 0, \dots, T-1, \\ \Leftrightarrow \quad & \bar{H}_t \cdot \frac{\bar{S}_t}{S_t^0} = \bar{H}_{t+1} \frac{\bar{S}_t}{S_t^0}, \quad t = 0, \dots, T-1, \end{aligned}$$

und somit ist (i) äquivalent zu (ii). Außerdem gilt für alle $t = 0, \dots, T-1$, dass

$$\begin{aligned} & \bar{H}_t \cdot \bar{X}_t = \bar{H}_{t+1} \cdot \bar{X}_t \\ \Leftrightarrow \quad & \bar{H}_{t+1} \cdot \bar{X}_{t+1} - \bar{H}_t \cdot \bar{X}_t = \bar{H}_{t+1} \cdot (\bar{X}_{t+1} - \bar{X}_t) = H_{t+1}(X_{t+1} - X_t). \end{aligned}$$

Dies ist nun äquivalent zu

$$V_t - V_0 = \sum_{s=1}^t H_s (X_s - X_{s-1}), \quad t = 1, \dots, T$$

und die Behauptung folgt. \square

Bemerkung 6 (Selbstfinanzierende Handelsstrategie). Startet man mit dem Betrag V_0 und einer d -dimensionalen Handelsstrategie H , so kann man eindeutig eine selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} bestimmen: Dies geschieht durch die Wahl von

$$H_{t+1}^0 - H_t^0 = -(H_{t+1} - H_t) \cdot X_t$$

und $H_1^0 = V_0 - H_1 \cdot X_0$. Sprechen wir im Folgenden von einer selbstfinanzierenden Handelsstrategie H , so meinen wir genau diese eindeutige Erweiterung \bar{H} .

Arbitrage

Wir kommen zu dem wichtigen Konzept einer Arbitrage. Das ist im Prinzip eine Möglichkeit, ohne Risiko Gewinne zu erwirtschaften. Natürlich gibt es solche Möglichkeiten an den Finanzmärkten, aber es wäre äußerst ungünstig, wenn ein Modell dies erlauben würde: Die Marktteilnehmer könnten das ausnutzen um auf unsere Kosten risikolose Gewinne zu erzielen! Wir beginnen mit einer präzisen Definition.

Definition 7. Eine *Arbitrage* ist eine selbstfinanzierende Handelsstrategie H , so dass für den zugehörigen (diskontierten) Wertprozess V gilt, dass

- (i) $V_0 \leq 0$,
- (ii) $V_T \geq 0$ und
- (iii) $P(V_T > 0) > 0$.

Ein Finanzmarkt, in dem keine Arbitragemöglichkeiten existierten, heißt *arbitragefrei*.

Für arbitragefrei nimmt man gerne auch die englische Abkürzung NA - no arbitrage. Die Definition ist unter den getroffenen Annahmen dazu äquivalent, dass der undiskontierte Wertprozess die obigen Bedingungen erfüllt (Wieso?).

Satz 8. Ein Finanzmarkt ist arbitragefrei genau dann, wenn jeder Ein-Perioden-Finanzmarkt (S_t, S_{t+1}) , $t = 0, \dots, T - 1$ arbitragefrei ist.

Beweis. Wir zeigen die Äquivalenz der Gegenaussagen: Es existiert eine Arbitrage genau dann, wenn ein $t \in \{1, \dots, T\}$ und eine \mathcal{F}_t -messbare Zufallsvariable $\xi \in \mathbb{R}^d$ existiert, s.d. $\xi \cdot \Delta X_t \geq 0$ P -fast sicher und $P(\xi \cdot \Delta X_t > 0) > 0$.

Wir starten mit der Hinrichtung: Sei \bar{H} eine Arbitrage mit Wertprozess V . Wir setzen

$$t := \min \{s \in \{1, \dots, T\} : V_s \geq 0 \text{ und } P(V_s > 0) > 0\}$$

mit der Konvention $\min \emptyset = \infty$. Dann ist $t \leq T$, da \bar{H} eine Arbitrage ist. Entweder ist $V_{t-1} = 0$, oder $P(V_{t-1} < 0) > 0$. Im ersten Fall gilt:

$$H_t \cdot (X_t - X_{t-1}) = V_t - V_{t-1} = V_t,$$

also erfüllt $\xi = H_t$ die Voraussetzungen. Im zweiten Fall setzen wir $\xi := H_t \mathbb{1}_{\{V_{t-1} < 0\}}$. Dann ist ξ \mathcal{F}_{t-1} -messbar und

$$\xi \cdot (X_t - X_{t-1}) = (V_t - V_{t-1}) \mathbb{1}_{\{V_{t-1} < 0\}} \geq -V_{t-1} \mathbb{1}_{\{V_{t-1} < 0\}} \geq 0.$$

Die rechte Seite ist positiv mit positiver Wahrscheinlichkeit, also erfüllt auch in diesem Fall das gewählte ξ die Voraussetzungen.

Nun betrachten wir die Rückrichtung. Sei dafür ξ eine \mathcal{F}_t -messbare Zufallsvariable, so dass $\xi \cdot \Delta X_t \geq 0$ und $P(\xi \cdot \Delta X_t > 0) > 0$. Wir setzen:

$$H_s = \begin{cases} \xi & \text{für } s = t \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dazu konstruieren wir mit $V_0 = 0$ eine selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} nach Bemerkung 6 mit

$$V_T = \xi \cdot (X_t - X_{t-1}),$$

eine Arbitrage. □

Oft gibt es Arbitrage-Strategien im Markt, und Akteure die solche Möglichkeiten ausnutzen, bringen den Markt wieder ins Gleichgewicht und die Arbitrage verschwindet. Wenn allerdings ein Modell Arbitrage zulässt, so kann dies systematisch ausgenutzt werden (möglicherweise - allerdings kann dies bei einem komplexen, und unbekanntem Modell auch fast unmöglich sein, so dass man auch an Modellen mit kleiner Arbitrage interessiert ist, siehe etwa ⁴).

⁴ Beatrice Acciaio, Julio Backhoff, and Gudmund Pammer. Quantitative fundamental theorem of asset pricing. 2022

Martingalmaße

Es ist interessant, dass sich das Konzept der Arbitrage mit dem wichtigen Konzept der Martingale verbinden lässt, allerdings unter einem geeignet gewählten Maß Q . Wir führen hierzu eine präzise Definition für Martingale ein. Q sei ein Maß auf dem Maßraum (Ω, \mathcal{F}) und wir betrachten nach wie vor die Filtration \mathbb{F} (die wir in der folgenden Definition nicht besonders hervorheben, wohl aber das Maß Q).

Definition 9. Ein stochastischer Prozess M heißt Q -Martingal, falls

- (i) M ist adaptiert,
- (ii) $E_Q[|M_t|] < \infty$ für $t = 0, \dots, T$,
- (iii) $M_s = E_Q[M_t | \mathcal{F}_s]$ für $0 \leq s \leq t \leq T$.

Dies führt uns nun zu dem Schlüsselkonzept Martingalmaß. Das ist ein Maß unter dem diskontierte Preisprozesse aller gehandelten Wertpapiere Martingale sind.

Definition 10. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q auf (Ω, \mathcal{F}_T) heißt *Martingalmaß*, falls der diskontierte Preisprozess X ein Q -Martingal ist.

Definition 11. Das Maß Q heißt *absolut stetig* zu P ($Q \ll P$) auf \mathcal{F}_T , falls

$$P(F) = 0 \quad \Rightarrow \quad Q(F) = 0 \quad \forall F \in \mathcal{F}_T.$$

Die Maße P und Q heißen *äquivalent* ($P \sim Q$), falls $Q \ll P$ und $P \ll Q$.

Der berühmte Satz von Radon-Nikodym behandelt genau die absolut stetigen Maße. Er sagt aus, dass für zwei absolut stetige Maße stets eine Dichte existiert.

Satz 12 (Satz von Radon-Nikodym). Sei $Q \ll P$. Dann existiert eine Zufallsvariable $L \geq 0$, s.d.

$$\int \xi dQ = \int \xi L dP \quad (13)$$

für alle Zufallsvariablen $\xi \geq 0$.

Für den Beweis verweisen wir etwa auf ⁵ (dieser wurde auch in der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie behandelt). Wir schreiben in diesem Fall kurz $dQ = LdP$ oder für die Dichte $L = \frac{dQ}{dP}$.

⁵ Patrick Billingsley. *Probability and Measure*. Wiley, 3 edition, 1995

Satz 14 (Bayes-Theorem). Sei $Q \ll P$ mit Dichte L . Dann gilt für $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, dass

$$E_P[L|\mathcal{F}'] \cdot E_Q[\xi|\mathcal{F}'] = E_P[L \cdot \xi|\mathcal{F}'] \quad P - f.s.$$

Beweis. Wir wählen $F \in \mathcal{F}$

$$\begin{aligned} \int_F E^P[L \cdot \xi|\mathcal{F}'] dP &= \int_F \xi \cdot L dP = \int_F \xi \cdot dQ = \int_F E^Q[\xi|\mathcal{F}'] dQ \\ &= \int_F E^Q[\xi|\mathcal{F}'] L dP \\ &= \int_F E^Q[\xi|\mathcal{F}'] \cdot E^P[L|\mathcal{F}'] dP. \square \end{aligned}$$

Der diskontierte Preis-Prozess X ist genau dann ein Q -Martingal, falls Integrierbarkeit gilt und für $i = 1, \dots, N$

$$E_Q \left[\frac{S_t^i}{S_t^0} \middle| \mathcal{F}_s \right] = \frac{S_s^i}{S_s^0}, \quad 0 \leq s \leq t \leq T.$$

Martingalmaße und L^p -Räume

Die Menge der äquivalenten Martingalmaße bezeichnen wir mit $\mathcal{M}_e(\mathbb{F}) = \mathcal{M}_e$. Die Menge der \mathcal{F} -messbaren Zufallsvariablen X für die $E_P[|X|^p] < \infty$ gilt, bezeichnen wir mit $\mathcal{L}^p(P, \mathcal{F})$. Für $p = \infty$ erhalten wir die Klasse der beschränkten Zufallsvariablen und für $p = 0$ die Klasse der \mathcal{F} -messbaren Abbildungen. Darüber hinaus bezeichnen wir mit $\mathcal{L}_+^0(P, \mathcal{F})$ die Menge der positiven \mathcal{F} -messbaren Abbildungen.

Zufallsvariablen unter Momentenbedingungen führen zu den L^p -Klassen von messbaren Abbildungen, die in der Funktionalanalyse eine wichtige Rolle spielen, siehe etwa ⁶. Wir unterscheiden die Abbildungen selbst (\mathcal{L}^p -Räume) von ihren Äquivalenzklassen (L^p -Räume). Wir beginnen mit den Abbildungen. Auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, \mathcal{F}, P) definieren wir den Raum der \mathcal{F} -messbaren Abbildungen (also aller Zufallsvariablen) mit Werten in \mathbb{R}^d durch $\mathcal{L}^0(\Omega, \mathcal{F}, P; \mathbb{R}^d)$. Wenn je nach Kontext einige der Argumente klar sind, lassen wir dementsprechend diese weg und schreiben etwa ⁷ \mathcal{L}^0 . Mit $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^0$ definieren wir diejenige Teilmenge von Zufallsvariablen mit p -ten Momenten, wo also $\|Z\|_p < \infty$, mit

$$\|Z\|_p := \begin{cases} E[|Z|^p]^{1/p} & \text{für } 0 < p < \infty \\ \inf\{c > 0 : P(|Z| > c) = 0\} & \text{für } p = \infty. \end{cases}$$

⁶ D. Werner. *Funktionalanalysis*. Springer, 2000

⁷ Für $1 \leq p \leq \infty$ sind die L^p -Räume Banachräume. Auf dem Raum L^0 betrachten wir die Metrik, die die Konvergenz in Wahrscheinlichkeit erzeugt,

$$d(X, Y) = E[|X - Y| \wedge 1].$$

Entsprechend definieren wir für $p \in [0, \infty]$ den Raum L^p als die zugehörigen Äquivalenzklassen definiert durch

$$Z \sim Z' \quad \Leftrightarrow \quad P(Z = Z') = 1.$$

Der Fundamentalsatz

Für den Fundamentalsatz starten wir mit einigen Vorbereitungen.

Satz 15. Sei $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$. Dann sind äquivalent:

- (i) Q ist Martingalmaß.
- (ii) Für jede beschränkte, selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} ist $V^{\bar{H}}$ ein Q -Martingal.
- (iii) Für jede selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} mit $E_Q[(V_T^{\bar{H}})^-] < \infty$ ist $V^{\bar{H}}$ ein Q -Martingal.
- (iv) Für jede selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} mit $V_T = V_T^{\bar{H}} \geq 0$ gilt

$$V_0 = E_Q[V_T].$$

Beweis. i) \Rightarrow ii): Sei \bar{H} selbstfinanzierend mit $|H_t^i| \leq c$, für $i = 0, \dots, d$, $t = 0, \dots, T$. Dann folgt, dass

$$|V_t| \leq |V_0| + \sum_{k=1}^t c \cdot \sum_{i=1}^d (|X_k^i| + |X_{k-1}^i|),$$

so dass $V_t \in L^1(Q)$ für $t \in \mathbb{T}$ folgt. Weiterhin ist:

$$\begin{aligned} E_Q[V_t | \mathcal{F}_{t-1}] &= E_Q[V_{t-1} + \bar{H}_t \cdot (\bar{X}_t - \bar{X}_{t-1}) | \mathcal{F}_{t-1}] \\ &= V_{t-1} + \bar{H}_t \cdot (E_Q[\bar{X}_t | \mathcal{F}_{t-1}] - \bar{X}_{t-1}) = V_{t-1}. \end{aligned}$$

ii) \Rightarrow iii): Wir beobachten, dass

$$E_Q[V_{T-1}^-] = E_Q[E_Q[V_T | \mathcal{F}_{T-1}]^-] \leq E_Q[E_Q[V_T^- | \mathcal{F}_{T-1}]] = E_Q[V_T^-] < \infty$$

mit der Jensenschen Ungleichung und es folgt $E_Q[V_t^-] < \infty$ für alle $0 \leq t \leq T$.

$E_Q[V_t^-] < \infty$ impliziert, dass $E_Q[V_t | \mathcal{F}_{t-1}] = V_{t-1}$ wohldefiniert ist, auch wenn diese Erwartungswerte ∞ annehmen können. Sei nun $a > 0$, \bar{H} selbstfinanzierend und $H_t^a := H_t \mathbf{1}_{\{|H_t| \leq a\}}$.

$$\begin{aligned} E_Q[V_t | \mathcal{F}_{t-1}] \mathbf{1}_{\{|H_t| \leq a\}} &= E_Q[\bar{H}_t \cdot \bar{X}_t \mathbf{1}_{\{|H_t| \leq a\}} | \mathcal{F}_{t-1}] \\ &= E_Q[\bar{H}_t (\bar{X}_t - \bar{X}_{t-1}) \mathbf{1}_{\{|H_t| \leq a\}} | \mathcal{F}_{t-1}] + V_{t-1} \mathbf{1}_{\{|H_t| \leq a\}} \\ &= V_{t-1} \mathbf{1}_{\{|H_t| \leq a\}}. \end{aligned}$$

Mit $a \uparrow \infty$ folgt also $E_Q[V_t | \mathcal{F}_{t-1}] = V_{t-1}$ und somit V ist unter Q ein Martingal.

iii) \Rightarrow iv): Klar.

iv) \Rightarrow i): Zuerst zeigen wir die Integrierbarkeit von X_t^i . Wir betrachten die selbstfinanzierende Handelsstrategie $\bar{H} = (H^0, H)$, gegeben durch

$$H_s^i = \mathbb{1}_{\{s \leq t\}}$$

und $H_s^j = 0$ für alle $s \in \mathbb{T}$ und $j \neq i$. Wir starten mit dem Anfangskapital $V_0 = X_0^i$ und erhalten, dass

$$V_T = X_T^i \geq 0.$$

Diese Handelsstrategie erfüllt also die Voraussetzung für (iv), so dass

$$X_0^i = V_0 = E_Q[V_T] = E_Q[X_T^i] = E_Q[|X_T^i|] < \infty, \quad (16)$$

wobei die letzte Ungleichung aus $\infty > V_0 = E_Q[|X_T^i|]$ folgt. Wir zeigen als nächstes, dass

$$E_Q[X_{t+1}^i \mathbb{1}_F] = E_Q[X_t^i \mathbb{1}_F] \quad \forall F \in \mathcal{F}_t.$$

Dazu wählen wir

$$H_s^i = \mathbb{1}_{\{s < t\}} + \mathbb{1}_{FC} \mathbb{1}_{\{s=t\}},$$

$H^j = 0$ für $j \neq i$ und konstruieren mit $V_0 = X_0^i$ eine selbstfinanzierende Handelsstrategie \bar{H} nach Bemerkung 6. Wir erhalten für den Endwert dieser Handelsstrategie, dass

$$V_T = \mathbb{1}_F X_{t-1}^i + \mathbb{1}_{FC} X_t^i \geq 0,$$

so dass ebenfalls die Voraussetzungen für (iv) erfüllt sind. Daraus folgt, dass

$$X_0^i = E_Q[V_T] = E_Q[\mathbb{1}_F X_{t-1}^i + \mathbb{1}_{FC} X_t^i].$$

Zusammen mit Gleichung (16) erhalten wir

$$E_Q[X_t^i] = E_Q[\mathbb{1}_F X_{t-1}^i + \mathbb{1}_{FC} X_t^i],$$

also $E_Q[\mathbb{1}_F X_t^i] = E_Q[\mathbb{1}_F X_{t+1}^i]$, und die Behauptung folgt. \square

Fundamentalsatz der Wertpapierbewertung

Der folgende Satz ist der wichtigste Satz unserer Vorlesung. Wir nennen ihn den Hauptsatz der Wertpapierbewertung (Fundamental Theorem of Asset Pricing, FTAP). Mit $\mathcal{M}_e(\mathbb{F}) = \mathcal{M}_e$ bezeichnen wir die Menge der äquivalenten (equivalent) \mathbb{F} -Martingalmaße.

Theorem 17. *Ein Markt ist genau dann frei von Arbitrage, falls ein äquivalentes Martingalmaß existiert. In diesem Fall existiert ein $Q \in \mathcal{M}_e$ mit beschränkter Dichte $\frac{dQ}{dP}$.*

Wir beweisen den Hauptsatz in mehreren Schritten. Die Rückrichtung stellt sich als überraschend leicht heraus. Sie ist auch die in der Anwendung am meisten verwendete Anwendung des Satzes.

Satz 18. *Ist $\mathcal{M}_e \neq \emptyset$, so ist der Markt frei von Arbitrage.*

Beweis. Wir verwenden Satz 15 (iii) und zeigen einen Widerspruch. Sei hierzu H eine Arbitrage mit diskontiertem Wertprozess V . Wir wählen ein $Q \in \mathcal{M}_e$.

Aus $V_0 \leq 0$ P -f.s. folgt auch $V_0 \leq 0$ Q -f.s. Ebenso $V_T \geq 0$ Q -f.s. Es folgt $E_Q[V_T^-] = 0 < \infty$.

Weiterhin ist $P(V_T > 0) > 0$, also auch $Q(V_T > 0) > 0$, also $E_Q[V_T] > 0$. Mit Satz 15 (iii) erhalten wir, dass V ein Q -Martingal ist, also

$$V_0 = E_Q[V_T] > 0,$$

ein Widerspruch zu $V_0 \leq 0$. □

Wir kehren zurück zum Beweis des Hauptsatzes. Nach Satz 8 reicht es, Arbitrage in jeder Periode zu untersuchen. Wir fixieren ein $t \in \mathbb{T}$ mit $t > 0$ und definieren:

$$K = \{H \cdot \Delta X_t : H \in L^0(P, \mathcal{F}_{t-1}, \mathbb{R}^d)\}.$$

Dies sind alle bedingten Ansprüche, die wir zum Preis Null erreichen können. Dann können wir No-Arbitrage auch äquivalent ausdrücken durch

$$K \cap L_+^0(\mathcal{F}_t, P, \mathbb{R}) = \{0\}.$$

Da t fixiert ist, schreiben wir im Folgenden kurz $L_+^0(\mathcal{F}_t, P, \mathbb{R}) = L_+^0$. Für zwei Mengen A und B bezeichnen wir mit

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$$

die direkte Summe dieser Mengen und analog mit $A - B$ die direkte Differenz.

Satz 19. Sei $t \in \mathbb{T}$ fixiert. Wir betrachten den Ein-Periodenmarkt von $t - 1$ nach t . Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) $K \cap L_+^0 = \{0\}$,
- (ii) $(K - L_+^0) \cap L_+^0 = \{0\}$,
- (iii) Es existiert ein äquivalentes Martingalmaß mit beschränkter Dichte,
- (iv) Es existiert ein äquivalentes Martingalmaß.

Beweis. Wir zeigen (iv) \Rightarrow (i) \Leftrightarrow (ii) und (iii) \Rightarrow (iv), der Teil (ii) \Rightarrow (iii) ist der Hauptteil des Beweises und wird im Anschluss studiert.

(iv) \Rightarrow (i): Sei $Q \in \mathcal{M}_e$. Wir zeigen einen Widerspruch. Dazu sei H eine \mathcal{F}_{t-1} -messbare, d -dimensionale Zufallsvariable, so dass $H \cdot (X_t - X_{t-1}) \geq 0$ und $P(H \cdot (X_t - X_{t-1}) > 0) > 0$. Dann ist ebenso $Q(H \cdot (X_t - X_{t-1})) > 0$.

Für jedes $c > 0$ setzen wir $H^c := H \mathbb{1}_{\{|H| \leq c\}}$. Wegen der σ -Stetigkeit⁸ des Wahrscheinlichkeitsmaßes Q gibt es ein c^* , so dass $Q(H^{c^*} \cdot (X_t - X_{t-1}) > 0) > 0$. Wäre nun $H^{c^*} \cdot (X_t - X_{t-1}) \in K \cap L_+^0 \setminus \{0\}$, so folgte, dass

$$E^Q[H^{c^*} \cdot (X_t - X_{t-1}) | \mathcal{F}_{t-1}] = H^{c^*} E^Q[X_t - X_{t-1} | \mathcal{F}_{t-1}] = 0,$$

was allerdings Widerspruch zu $H^{c^*} \cdot (X_t - X_{t-1}) \geq 0$ ist, so dass wir die Aussage (i) erhalten.

(i) \Rightarrow (ii): Wir betrachten ein $Z \in (K - L_+^0) \cap L_+^0$. Dann existiert ein \mathcal{F}_{t-1} -messbares H und $U \in L_+^0$, s.d.

$$Z = H \cdot (X_t - X_{t-1}) - U \geq 0.$$

Es gilt also $H \cdot (X_t - X_{t-1}) \geq U \geq 0$, und somit $H \cdot (X_t - X_{t-1}) \in K \cap L_+^0$. Nach (i) folgt $H \cdot (X_t - X_{t-1}) = 0$, also $U = 0$ und somit $Z = 0$.

Die weiteren Aussagen (ii) \Rightarrow (i) und (iii) \Rightarrow (iv) folgen unmittelbar. \square

⁸ Für eine monoton wachsend (fallende) Folge $A_n \in \mathcal{F}$ mit gilt $Q(A_n) \rightarrow Q(A)$, wobei A die Vereinigung (Durchschnitt) aller (A_n) ist.

Wir zeigen nun, dass es genügt, sich auf integrierbare Zufallsvariablen X_t und X_{t+1} zu konzentrieren.

Lemma 20. Für den Schritt (ii) \Rightarrow (iii) reicht es $E[|X_t|] < \infty$, $E[|X_{t-1}|] < \infty$ zu betrachten.

Beweis. Wir konstruieren zunächst $\tilde{P} \sim P$, so dass die Erwartungswerte existieren. Sei dazu $c > 0$ und

$$Z := \frac{c}{1 + |X_t| + |X_{t-1}|} \leq c$$

eine positive Dichte und $d\tilde{P} = Z dP$. Offensichtlich ist $\tilde{E}[|X_t|] < \infty$ und $\tilde{E}[|X_{t-1}|] < \infty$. Die Bedingung (ii) hängt nur von den Nullmengen von P ab, also gilt (ii) genau dann, wenn es für \tilde{P} gilt. Ist $Q^* \in \mathcal{M}_e$, so ist

$$\frac{dQ^*}{dP} = \frac{dQ^*}{d\tilde{P}} \cdot \frac{d\tilde{P}}{dP} = \frac{dQ^*}{d\tilde{P}} \cdot Z.$$

Die Dichte von Q^* bezüglich P ist demnach genau dann beschränkt, wenn sie es bezüglich \tilde{P} ist. \square

Im Folgenden können wir also ohne Beschränkung der Allgemeinheit von $E[|X_t|] < \infty$ und $E[|X_{t-1}|] < \infty$ ausgehen.

Wir werden Erwartungswerte für eine Klasse von Zufallsvariablen betrachten, z.B. bedingte Erwartungen. Wir definieren den konvexen Kegel

$$C = (K - L_+^0) \cap L^1.$$

Lemma 21. Sei $c \geq 0$ und $Z \in L^\infty(P, \mathcal{F}_t)$, so dass

$$E[ZW] \leq c \quad \text{für alle } W \in C. \quad (22)$$

Dann gilt:

- (i) $E[ZW] \leq 0$ für alle $W \in C$,
- (ii) $Z \geq 0$ P-f.s.,
- (iii) Ist $P(Z > 0) > 0$, so ist durch

$$\frac{dQ}{dP} := Z$$

ein Martingalmaß (und $Q \ll P$) definiert.

Beweis. (i) C ist ein Kegel, denn mit $W \in C$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ folgt $\alpha W \in C$. Dann ist

$$E[\alpha ZW] = \alpha \cdot E[ZW] \leq \alpha c.$$

Wir erhalten, dass diese Gleichung bereits für $c = 0$ gelten muss.

(ii) Wir wählen $W = -\mathbb{1}_{\{Z < 0\}}$. Dann ist

$$E[Z_-] = E[ZW] \leq 0,$$

also $Z_- = 0$ und somit $Z \geq 0$ P -f.s.

(iii) Wir wählen H in $L^\infty(P, \mathcal{F}_{t-1}, \mathbb{R}^d)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ und setzen $Y = (X_t - X_{t-1}) \in C$. Dann ist

$$E[ZHY] \leq c \quad \text{und} \quad E[\alpha ZHY] \leq c,$$

so dass wie oben $E[ZHY] \leq 0$ folgt. Außerdem ist für alle $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha E[ZHY] \leq 0,$$

also $E[ZHY] = 0 = E[H(X_t - X_{t-1})]$. Wir erhalten $E^Q[\mathbb{1}_F(X_t^i - X_{t-1}^i)] = 0$ für alle $F \in \mathcal{F}_{t-1}$, also ist X Q -Martingal. \square

Exkurs: Hahn-Banach auf lokal konvexen Räumen

Ein *topologischer Vektorraum* E ist ein Vektorraum mit einer Topologie, so dass gilt:

- (i) die Addition ist stetig,
- (ii) die Skalarmultiplikation ist stetig.

Wir nennen einen topologischer Vektorraum E *lokal konvexen Raum*, falls seine Topologie von einer Basis aus konvexen Mengen erzeugt wird. Für weitere Informationen hierzu sei auf ⁹ verwiesen.

⁹ D. Werner. *Funktionalanalysis*. Springer, 2000

Theorem 23 (Hahn-Banach). *Seien B und C nicht-leere Teilmengen des lokal konvexen Raumes E und*

- (i) $B \cap C = \emptyset$,
- (ii) B, C konvex,
- (iii) B kompakt, C abgeschlossen.

Dann gibt es ein stetiges lineares Funktional $\ell : E \rightarrow \mathbb{R}$, so dass

$$\sup_{x \in C} \ell(x) < \inf_{x \in B} \ell(x).$$

Nach Lemma 21 reduziert sich der Beweis des Hauptsatzes auf Konstruktion eines positiven Elements von

$$\mathcal{Z} := \{Z \in L^\infty, 0 \leq Z \leq 1, P(Z > 0) > 0, E[ZW] \leq 0 \forall W \in C\}$$

mit dem konvexen Kegel $C = (K - L_+^0) \cap L^1$. Wir nehmen zunächst an, dass C abgeschlossen ist, so dass wir den Satz von Hahn-Banach anwenden können.

Lemma 24. *Angenommen C ist abgeschlossen in L^1 , und $C \cap L_+^1 = \{0\}$. Dann existiert für alle $F \in L_+^1 \setminus \{0\}$ ein $Z \in \mathcal{Z}$, s.d. $E[FZ] > 0$.*

Beweis. Sei $B = \{F\}$, s.d. $B \cap C = \emptyset$, $C \neq \emptyset$, beide Mengen sind konvex, B ist kompakt und C abgeschlossen nach Voraussetzung.

Mit dem Satz von Hahn-Banach existiert ein stetiges lineares Funktional ℓ , s.d.

$$\sup_{W \in C} \ell(W) < \ell(F)$$

Der Dualraum L^1 kann mit L^∞ identifiziert werden, s.d. $Z \in L^\infty$ existiert mit

$$\ell(F') = E[Z \cdot F'], \quad F' \in L^1.$$

O.B.d.A. $\|Z\|_\infty = 1$. Es folgt $E[ZW] < E[ZF] \forall W \in C$, so dass Z die Voraussetzungen von Lemma 21 erfüllt. Es folgt, dass $Z \in \mathcal{Z}$. Mit $0 = W \in C$ erhalten wir $E[FZ] > 0$. \square

Der nächste Schritt ist es, ein $Z^* > 0$ auszuwählen.

Lemma 25. *Angenommen C ist abgeschlossen in L^1 und*

$$C \cap L_+^1 = \{0\}.$$

Dann existiert $Z^ \in \mathcal{Z}$ mit $Z^* > 0$ P-f.s.*

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass \mathcal{Z} abzählbar konvex ist: Das heisst für alle $\alpha_k \in [0, 1]$, $k \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{k=1}^\infty \alpha_k = 1$, und $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{Z}$, gilt, dass

$$Z := \sum_{k=1}^\infty \alpha_k Z_k \in \mathcal{Z}.$$

Dies sieht man wie folgt: Für $W \in C$ gilt, dass

$$\sum_{k=1}^\infty |\alpha_k Z_k W| \leq |W| \sum_{k=1}^\infty \alpha_k = |W| \in L^1.$$

Mit dominierter Konvergenz erhalten wir

$$E[ZW] = \sum_{k=1}^\infty \alpha_k E[Z_k W] \leq 0$$

und somit ist $Z \in \mathcal{Z}$ und \mathcal{Z} ist in der Tat abzählbar konvex. Setze

$$c := \sup\{P(Z > 0) : Z \in \mathcal{Z}\}.$$

Wir wählen eine Folge $(Z_n) \in \mathcal{Z}$, so dass $P(Z_n > 0) \rightarrow c$. Dann ist

$$Z^* := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} Z_k \in \mathcal{Z}$$

nach der obigen Beobachtung. Darüber hinaus ist $\{Z^* > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{Z_k > 0\}$, also

$$P(Z^* > 0) \geq \sup_{k \in \mathbb{N}} P(Z_k > 0) = c.$$

Wir zeigen die Behauptung mit einem Widerspruch. Dazu nehmen wir an, dass $P(Z^* = 0) > 0$. Dann ist $F := 1_{\{Z^*=0\}} \neq 0$ und $F \in L_+^1$. Nach Lemma 24 gibt es $Z' \in \mathcal{Z}$, s.d.

$$0 < E[FZ'] = E[1_{\{Z^*=0\}}Z'].$$

also $P(\{Z' > 0\} \cap \{Z^* = 0\}) > 0$. Dann ist

$$P\left(\frac{1}{2}(Z' + Z^*) > 0\right) > P(Z^* > 0)$$

ein Widerspruch zur Maximalität von Z^* und es folgt in der Tat $P(Z^* > 0) = 1$. □

Das folgende Lemma erlaubt uns aus einer Folge eine messbare und konvergente *Teilfolge* auszuwählen. Es ist eine Verallgemeinerung des Satzes von *Bolzano-Weierstraß*¹⁰ auf unendlichdimensionale Räume, wie wir sie hier betrachten. Typischerweise reicht im Unendlichdimensionalen Beschränktheit nicht mehr, weswegen wir Existenz eines endlichen Häufungspunktes fordern.

¹⁰ Hierüber gibt es eine sehr schöne Wikipedia-Seite.

Lemma 26. Sei (H_n) eine Folge von d -dim. Zufallsvariablen mit $\liminf_n |H_n| < \infty$. Dann gibt es ein $H \in L^0(\mathbb{R}^d)$ und eine strikt monoton wachsende Folge (σ_m) von ganzzahligen Zufallsvariablen, so dass

$$H_{\sigma_m(\omega)}(\omega) \rightarrow H(\omega)$$

für P -fast alle ω .

Beweis. Wir konstruieren die Teilfolge punktweise, so dass wir das Resultat auf den klassischen Bolzano-Weierstraß zurückführen können. Zunächst konstruieren wir eine Teilfolge so, dass $(|H_{\sigma_m}^0|)$ gegen den kleinsten Häufungspunkt $\lambda := \liminf_n |H_n|$ konvergiert

(und zwar für fast alle $\omega \in \Omega$). Dann betrachten wir nacheinander jede Koordinate und beschleunigen die Folgen jeweils so, dass auch jede Koordinate konvergiert.

Sei $\sigma_m = m$ auf $\{\lambda = \infty\}$. Auf $\{\lambda < \infty\}$ definieren wir $\sigma_1^0 := 1$ und

$$\sigma_m^0(\omega) := \inf \left\{ n > \sigma_{m-1}^0(\omega) : ||H_n(\omega) - \lambda(\omega)|| \leq \frac{1}{m} \right\} \quad m = 2, 3, \dots$$

Sei $H^i := \liminf_{m \rightarrow \infty} H_{\sigma_m^{i-1}}^i$ $i = 1, \dots, d$. Sei $\sigma_1^i = 1$ und

$$\sigma_m^i(\omega) := \inf \left\{ \sigma_n^{i-1}(\omega) : \sigma_n^{i-1}(\omega) > \sigma_{m-1}^i(\omega) \quad \text{und} \quad |H_{\sigma_n^{i-1}(\omega)}^i(\omega) - H^i(\omega)| \leq \frac{1}{n} \right\}$$

$\sigma_m := \sigma_m^d$ auf $\{\lambda < \infty\}$ gibt die gesuchte Folge. \square

Eigentlich wären wir schon fast am Ziel unsere Beweises angelangt, allerdings können zwei verschieden Portfolien zu dem gleichen Endwert führen, oder: anders formuliert, es könnte sein, dass

$$H(X_t - X_{t-1}) = 0$$

gilt obwohl $H \neq 0$. Dieses Problem überwinden wir mit geeigneten Orthogonalkomplementen. Für das folgende Lemma versehen wir L^0 mit der Topologie der Konvergenz in Wahrscheinlichkeit¹¹, erzeugt von der Halbmetrik $E[|X - Y| \wedge 1]$.

¹¹ Auch hier gibt es einen Wikipedia-Artikel, https://de.wikipedia.org/wiki/Konvergenz_in_Wahrscheinlichkeit.

Lemma 27. *Wir definieren:*

$$N = \{H \in L^0(\Omega, \mathcal{F}_{t-1}, P; \mathbb{R}^d) : H(X_t - X_{t-1}) = 0 \quad P\text{-f.s.}\}$$

$$N^\perp = \{G \in L^0(\Omega, \mathcal{F}_{t-1}, P; \mathbb{R}^d) : G \cdot H = 0 \text{ für alle } H \in N\}$$

Dann gilt

- (i) N, N^\perp sind abgeschlossen in L^0 , und $gH \in N$, falls $H \in N$, $g \in L^0(\Omega, \mathcal{F}_{t-1}, P; \mathbb{R})$, sowie $gG \in N^\perp$ falls $G \in N^\perp$.
- (ii) $N \cap N^\perp = \{0\}$.
- (iii) Jedes $G \in L^0(\Omega, \mathcal{F}_{t-1}, P, \mathbb{R}^d)$ hat die eindeutige Zerlegung:

$$G = H + G^\perp, \quad H \in N, \quad G^\perp \in N^\perp.$$

Beweis. (i) Gilt $H_n \xrightarrow{P} H$, so gibt es eine f.s. konvergierende Teilfolge (H_{σ_m}) . Dann gilt:

$$H_{\sigma_m}(\omega) \cdot (X_t(\omega) - X_{t-1}(\omega)) \rightarrow H(\omega)(X_t(\omega) - X_{t-1}(\omega)) \quad \text{für } P\text{-fast alle } \omega. \quad (28)$$

Ist $(H_n) \subseteq N$ eine Folge von Elemente aus N mit $H_n \rightarrow H$ f.s., so folgt, dass die linke Seite von (28) gleich Null ist, also auch der Grenzwert (die rechte Seite) und somit ist $H \in N$.

Ebenso folgt aus $(G_k) \subseteq N^\perp$ mit $G_n \rightarrow^{f.s.} G$, dass $G \in N^\perp$, so dass N und N^\perp abgeschlossen sind.

Aus $H\Delta X = 0$ folgt, dass $gH\Delta X = 0$, also ist $gH \in N$ und ebenso folgt $gG \in N^\perp$.

(ii) Angenommen $G \in N \cap N^\perp$, dann folgt:

$$0 = G \cdot G = |G| \Leftrightarrow G = 0 \quad P\text{-f.s.}$$

(iii) Für $\zeta \in \mathbb{R}^d$ stellen wir ζ dar als $\zeta = \zeta^1 e_1 + \dots + \zeta^d e_d$ mit einer Basis $\{e_1, \dots, e_d\}$. Nehmen wir zunächst an, dass $e_i = n_i + e_i^\perp$ mit $n_i \in N$ und $e_i^\perp \in N^\perp$. Dann ist:

$$\zeta = \underbrace{\sum_{i=1}^d \zeta n_i}_{\in N} + \underbrace{\sum_{i=1}^d \zeta_i e_i^\perp}_{\in N^\perp}$$

Die Zerlegung ist eindeutig, da $N \cap N^\perp = \{0\}$.

Wir zeigen noch $e_i = n_i + e_i^\perp$. Dazu betrachten wir den Hilbertraum $L^2 = L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, P; \mathbb{R}^d)$ mit Skalarprodukt $\langle X, Y \rangle = E[XY]$. Sowohl $N \cap L^2$ als auch $N^\perp \cap L^2$ sind abgeschlossene Unterräume von L^2 , da stochastische Konvergenz L^2 -Konvergenz impliziert und wir bereits Abgeschlossenheit von N und N^\perp gezeigt haben. Wir definieren die orthogonalen Projektionen

$$\pi : L^2 \rightarrow N \cap L^2, \quad \pi^\perp : L^2 \rightarrow N^\perp \cap L^2$$

und setzen $n_i = \pi(e_i)$, $e_i^\perp = \pi^\perp(e_i)$.

Nun betrachten wir $\zeta := e_i - \pi(e_i)$. Da $\pi(e_i)$ die orthogonale Projektion ist, gilt

$$\langle \zeta, n \rangle = 0 \tag{29}$$

für alle $n \in N \cap L^2$. Zunächst ist $e_i \in L^2$ und ebenfalls $\pi(e_i)$, also ist $\zeta \in L^2$. Wir zeigen, dass $\zeta \in N^\perp$: Angenommen, $\zeta \notin N^\perp \cap L^2$. Dann gibt es ein $H \in N$ mit $P(\zeta \cdot H > 0) > 0$. Setze

$$\tilde{H} := H \mathbf{1}_{\{\zeta \cdot H > 0, |H| \leq c\}} \in N \cap L^2$$

für ein noch zu wählendes c . Ist c groß genug, so gilt

$$0 < E[\tilde{H} \cdot \zeta] = \langle \tilde{H}, \zeta \rangle,$$

ein Widerspruch zu (29). □

Beispiel 30 (C ist nicht abgeschlossen). Sei $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F}_1 = \text{Borel-}\sigma\text{-Algebra}$, $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, $\Delta X(\omega) = \omega$ (dies ist offensichtlich ein Markt mit Arbitrage).

Zunächst ist C eine echte Teilmenge von L^1 : Ist $F \geq 1$, so ist F nicht aus C !

Wir betrachten

$$F_n = (F^+ \cap n)\mathbb{1}_{[1/n,1]} - F^- \quad \text{für } F \in L^1$$

und somit gilt $F_n \xrightarrow{L^1} F$. Weiterhin ist $F_n \in C$, da

$$(F^+ \wedge n)\mathbb{1}_{[1/n,1]} \leq \begin{cases} n & \omega \in [1/n,1], \\ 0 & \omega \in [0,1/n). \end{cases}$$

und somit $(F^+ \wedge n)\mathbb{1}_{[1/n,1]} \leq n \cdot n\Delta X = n^2\Delta X$. $\Delta X \geq 1/n \iff n\Delta X \geq 1$ auf $\omega \geq 1/n$, also $(F^+ \wedge n)\mathbb{1}_{[1/n,1]} = U + n^2\Delta X$ mit $n \geq 0$.

Das folgende Lemma zeigt, dass die im obigen Beispiel nicht erfüllte Voraussetzung $K \cap L_+^0 = \{0\}$ bereits reicht, um Abgeschlossenheit zu erreichen.

Lemma 31. *Gilt $K \cap L_+^0 = \{0\}$, so ist $K - L_+^0$ abgeschlossen in L^0 .*

Beweis. Sei $W_n \in K - L_+^0$, so dass $W_n \rightarrow W$ in L^0 (also in Wahrscheinlichkeit). Durch Übergang zu einer Teilfolge können wir o.B.d.A. annehmen, dass $W_n \rightarrow W$ f.s. Es gilt

$$W_n = \tilde{H}_n \cdot \Delta X - U_n \stackrel{L.27}{=} \tilde{H}_n \Delta X + H_n^\perp \Delta X - U_n = H_n^\perp \Delta X - U_n =: H_n \Delta X - U_n,$$

da $\tilde{H}_n \Delta X = 0$.

Zunächst nehmen wir an, dass $\liminf |H_n| < \infty$ P -f.s. Nach Lemma 26 gilt, dass $H_{\sigma_n} \rightarrow H$ P -f.s. für eine monoton wachsende Folge (σ_n) . Ebenso ist:

$$0 \leq U_{\sigma_n} = H_{\sigma_n} \Delta X - W_{\sigma_n} \rightarrow H \Delta X - W =: U \quad P\text{-f.s.}$$

mit $U \geq 0$, also $W \in K - L_+^0$.

Wir zeigen noch, dass $\liminf |H_n| < \infty$ P -f.s. Definiere die normierte Handelsstrategie $\xi_n = \frac{H_n}{|H_n|}$ und setze $A = \{\omega \in \Omega : \liminf |H_n| = \infty\}$. Lemma 26 angewendet auf $\xi_n = \frac{H_n}{|H_n|}$ liefert eine Teilfolge (τ_n) , so dass $\xi_{\tau_n} \rightarrow \xi$ P -f.s.. Nun gilt:

$$0 \leq \mathbb{1}_A \frac{U_{\tau_n}}{|H_{\tau_n}|} = \mathbb{1}_A \left(\frac{H_{\tau_n}}{|H_{\tau_n}|} \cdot \Delta X - \frac{W_{\tau_n}}{|H_{\tau_n}|} \right) \rightarrow \mathbb{1}_A \xi \Delta X \quad P\text{-f.s.},$$

da $\frac{W_{\tau_n}}{|H_{\tau_n}|} \rightarrow 0$. Nun ist $\mathbb{1}_A \xi \in L^0(\mathcal{F}_{t-1})$ und die Annahme $K \cap L_+^0 = \{0\}$ impliziert $\mathbb{1}_A \xi \Delta X = 0$.

Wir möchten schließen, dass hieraus $\mathbb{1}_A \xi = 0$ folgt und verwenden, wie bereits bemerkt, hierfür die Technik des Orthogonalkomplements.

Damit zeigen wir, dass $\mathbb{1}_A \tilde{\zeta} \in N^\perp$, so dass $\tilde{\zeta} = 0$ und damit $P(A) = 0$ folgt. (wegen $|\tilde{\zeta}| = 1$).

Hierzu gehen wir wie folgt vor: Für $\eta \in N$ gilt, dass

$$\tilde{\zeta}_{\tau_n} \cdot \eta = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{\tau_n=k\}} \frac{1}{|H_k|} H_k \cdot \eta = 0,$$

da $H_k \in N^\perp$ und somit $H_k \cdot \eta = 0$. Wir erhalten $\tilde{\zeta}_{\tau_n} \in N^\perp$. Da N^\perp abgeschlossen ist, folgt $\tilde{\zeta} \in N^\perp$. \square

Beispiele

In diesem Kapitel werden einige wichtige Beispiele eingeführt, die die vorherigen Techniken illustrieren und zentral in der Anwendung sind.

Das Cox-Ross-Rubinstein Modell

Dieses wichtige Beispiel ist ein Binomialmodell mit mehreren Zeiperioden. Es ist überraschend, dass sich die zentralen Fragestellungen in der Finanzmathematik bereits an Bi- und Trinomialmodellen sehr gut illustrieren lassen. Ebenso kann über Verteilungskonvergenz etwa das Black-Scholes Modell als Grenzwert erreicht werden, und sich so auch gewisse Formeln erreichen. Man sollte allerdings auch im Hinterkopf haben, dass gewissen Regeln wie Freiheit von Arbitrage, Existenz von Hedging-Strategien, faire Bewertungsregeln, etc. nicht unbedingt unter Konvergenz erhalten bleiben. Das wird im Folgenden nicht weiter diskutiert.

Wir nehmen an, dass das Bankkonto der Gleichung

$$S_t^0 = (1+r)^t, \quad t = 0, \dots, T$$

genügt mit der Bedingung $r > -1$. Somit ist S^0 deterministisch, als nicht zufällig.

Darüber hinaus sei $d = 1$, und wir schreiben kurz $S^1 = S$. Für den Aktienkurs S gelte, dass

$$S_t = S_0 \prod_{i=1}^t \xi_i, \quad t = 1, \dots, T.$$

Hierbei sind ξ_1, \dots, ξ_T Zufallsvariablen mit $\xi_i \in \{1+u, 1+d\}$ wobei wir $-1 \leq d \leq u$ fordern. Wir nehmen an, dass $P(\xi_i = 1+u) \in (0, 1)$ für $i = 1, \dots, T$. Die zugehörige Filtration definieren wir durch

$$\mathcal{F}_t = \sigma(S_1, \dots, S_t), \quad t = 0, \dots, T.$$

Satz 32. Das CRR-Modell erfüllt (NA) genau dann, wenn $d < r < u$. Unter Q sind (ξ_t) i.i.d. mit $Q(\xi_t = 1+u) = \frac{r-d}{u-d}$ für $t = 1, \dots, T$.

Beweis. Wir berechnen das äquivalente Martingalmaß. Es wird sich herausstellen, dass es höchstens eines gibt. Die Martingal-Bedingung bedeutet, dass

$$E_Q \left[\frac{S_t}{S_t^0} \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right] = \frac{S_{t-1}}{S_{t-1}^0}, \quad t = 1, \dots, T.$$

Nun kann man die multiplikative Struktur hervorragend ausnutzen und sieht, dass dies äquivalent ist zu

$$E_Q \left[\frac{\zeta_t}{1+r} \mid \mathcal{F}_{t-1} \right] = 1, \quad t = 1, \dots, T.$$

Da ζ_t jeweils nur zwei Werte annehmen kann, erhalten wir die folgende hinreichende und notwendige Bedingung für NA:

$$\begin{aligned} & Q(\zeta_t = 1+u \mid \mathcal{F}_{t-1}) \frac{1+u}{1+r} + Q(\zeta_t = 1+d \mid \mathcal{F}_{t-1}) \frac{1+d}{1+r} = 1, \\ \Leftrightarrow & Q(\zeta_t = 1+u \mid \mathcal{F}_{t-1}) \frac{1+u}{1+r} + (1 - Q(\zeta_t = 1+u \mid \mathcal{F}_{t-1})) \frac{1+d}{1+r} = 1, \\ \Leftrightarrow & Q(\zeta_t = 1+u \mid \mathcal{F}_{t-1}) \left(\frac{1+u}{1+r} - \frac{1+d}{1+r} \right) = 1 - \frac{1+d}{1+r}, \\ \Leftrightarrow & Q(\zeta_t = 1+u \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \frac{r-d}{u-d}. \end{aligned}$$

Wir lesen zunächst ab, dass $Q(\zeta_t = 1+u \mid \mathcal{F}_{t-1})(\omega)$ deterministisch ist, also nicht von ω abhängen kann. Obwohl dies unter P der Fall sein kann, sind damit unter Q die (ζ_i) unabhängig und darüber hinaus identisch verteilt. Außerdem muss, um Äquivalenz zu erreichen

$$\frac{r-d}{u-d} \in (0, 1)$$

gelten, also $d < r < u$. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, kann es kein äquivalentes Martingalmaß geben, also gibt es Arbitrage. \square

Das Bachelier Modell

In der Dissertation "Théorie de la Speculation" stellte Louis Bachelier bereits 1900 ein Modell für Aktienkurse vor. Es orientiert sich an der Brownschen Bewegung (und lässt negative Werte für den Aktienkurs zu). S^0 modellieren wir wie im vorigen Kapitel, aber dieses Mal ist

$$S_t = S_0 + \mu t + \sigma W_t, \quad t = 0, \dots, T$$

wobei W eine (diskrete) Brownsche Bewegung ist, das heißt

$$W_t = \sum_{i=1}^t \zeta_i,$$

mit (ζ_i) i.i.d. und standardnormalverteilt. Ist dieses Modell frei von Arbitrage?

Das (diskrete) Black-Scholes Modell

Die bahnbrechende Arbeit Black & Scholes (1973) verwendet statt der Brownschen Bewegung eine geometrische Brownsche Bewegung.

Diese hat eine ähnliche multiplikative Struktur wie das CRR Modell, und garantiert positive Aktienkurse.

Wir nehmen an, dass

$$S_t = S_0 \prod_{i=1}^t e^{\eta_i},$$

mit

$$\eta_i = \tilde{\mu} + \sigma \Delta W_i = \tilde{\mu} + \sigma \xi_i,$$

wobei eben $\Delta W_t = W_t - W_{t-1} = \xi_t$ ist und W die obige diskrete Brownsche Bewegung. Ist dieses Modell frei von Arbitrage? Konstruieren Sie ein Martingalmaß!

Wenn man den Erwartungswert von S_t ausrechnet, erhält man $\exp(\tilde{\mu}t + 1/2\sigma^2 T)$. Aus diesem Grund verwendet man oft die Parametrisierung

$$S_t = S_0 \exp\left(\mu t - \frac{\sigma^2 t}{2} + \sigma W_t\right), \quad (33)$$

was wir im Folgenden als das (diskrete) *Black-Scholes Modell* bezeichnen werden.

Im diskreten Black-Scholes Modell gibt es viele äquivalente Martingalmeasures, ganz im Gegensatz zum kontinuierlichen Black-Scholes Modell. Unter diesen muss man sich für das Pricing ein Maß aussuchen und wir wählen das Maß so, dass W_t auch unter Q normalverteilt ist, und zwar mit gleicher Varianz.

Dies ist motiviert dadurch, dass man die Varianz sehr gut schätzen kann, und somit hier weniger Unsicherheit besteht.

Lemma 34. *Ist $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ unter P und ist $dQ = LdP$ gegeben durch die Dichte*

$$L = \alpha \cdot e^{\beta \xi + \gamma \xi^2},$$

mit

$$\alpha = \sigma e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}}, \quad \beta = e^{-\frac{\mu}{\sigma^2}}, \quad \gamma = \frac{1}{2\sigma^2},$$

so ist $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ unter Q .

Beweis. Wir berechnen die Laplace-Transformierte von ξ unter Q . Zunächst ist die Laplace-Transformierte einer $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ -Verteilung

gegeben durch

$$\begin{aligned}
E_Q[e^{u\tilde{\xi}}] &= \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{ux - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2 - 2x\mu - 2ux\sigma^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2 - 2xa + a^2 - a^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= e^{-\frac{\mu^2 - a^2}{2\sigma^2}} \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= e^{-\frac{\mu^2 - \mu^2 - 2\mu u\sigma^2 - u^2\sigma^4}{2\sigma^2}} = e^{\mu u + \frac{u^2\sigma^2}{2}} \tag{35}
\end{aligned}$$

mit $a = \mu + u\sigma^2$. Nun berechnen wir die Dichte und machen den Ansatz $L = \alpha \cdot e^{\beta\tilde{\xi} + \gamma\tilde{\xi}^2}$

$$\begin{aligned}
E_Q[e^{u\tilde{\xi}}] &= E_P[Le^{u\tilde{\xi}}] = e^\alpha E_P[e^{u\tilde{\xi} + \beta\tilde{\xi} + \gamma\tilde{\xi}^2}] \\
&= e^\alpha \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ux + \beta x + \gamma x^2 - \frac{x^2}{2}} dx \\
&= \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{ux - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx
\end{aligned}$$

durch die Wahl von

$$\begin{aligned}
\alpha &= \frac{\sqrt{2\pi\sigma^2}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} = \sigma e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \\
\beta &= e^{-\frac{2x\mu}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{x\mu}{\sigma^2}} \\
\gamma &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sigma^2}
\end{aligned}$$

und die Behauptung folgt. \square

Satz 36. Nehmen wir an, dass $S^0 = e^r$. Dann ist das diskrete Black-Scholes Modell ist frei von Arbitrage, und es gibt ein äquivalentes Martingalmaß, so dass

$$S_t = S_0 \exp\left(rt - \frac{\sigma^2 t}{2} + \sigma W_t\right),$$

wobei $W_t = \sum_{s=1}^t \tilde{\xi}_s$ mit $\tilde{\xi}_1, \tilde{\xi}_2, \dots$ iid und standardnormalverteilt unter Q .

Beweis. Wie im vorigen Lemma wählen wir einen geeigneten Maßwechsel. Wir starten direkt in der Parametrisierung von Gleichung (33). Dabei ist W^P (also W unter P) gegeben durch

$$W_t^P = \sum_{s=1}^t \eta_s$$

mit (η_s) iid und standardnormalverteilt unter P . Aus Gleichung (33) erhalten wir

$$\begin{aligned}\ln \frac{S_t}{S_0} &= \mu t - \frac{\sigma^2 t}{2} + \sigma W_t^P \\ &= \sum_{s=1}^t \mu + \sigma \eta_s - \frac{\sigma^2 t}{2}.\end{aligned}$$

Als Maßwechsel suchen wir also die Transformation von η mit Erwartungswert 0 nach Erwartungswert $r - \mu / \sigma$. Dies gelingt nun direkt mit Lemma 34.

Wir überprüfen noch, Q auch ein Martingalmaß ist. Dazu betrachten wir

$$X_t = \frac{S_t}{S_t^0} = S_0 \exp\left(-\frac{\sigma^2 t}{2} + \sigma W_t^Q\right),$$

für $t \geq 0$. X ist ein Martingal, da

$$\begin{aligned}E_Q[X_t | \mathcal{F}_{t-1}] &= X_{t-1} E_Q\left[e^{-\frac{\sigma^2 t}{2} + \sigma \xi_t}\right] \\ &= X_{t-1} \cdot e^{-\frac{\sigma^2 t}{2}} \cdot e^{\frac{\sigma^2 t}{2}}\end{aligned}$$

mit der Hilfe von Gleichung (35). □

Konvergenz gegen das Black-Scholes Modell

Wir betrachten die Zeitpunkte $0, \frac{T}{N}, \dots, \frac{NT}{N}$ und ein *Numéraire* für welches

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (1 + r_N)^N = e^{rT} \quad (37)$$

gelte. Dies ist äquivalent dazu, dass $r_N N \rightarrow rT$. Wir betten das Modell in das obige Gitter ein durch

$$S_{\frac{kT}{N}}^N = S_0 \prod_{i=1}^k (1 + \xi_i^N) \quad (38)$$

mit unabhängigen Zufallsvariablen ξ_1^N, ξ_2^N, \dots . Dazu nehmen wir lediglich an, dass

$$-1 < \alpha_N \leq \xi_i^N \leq \beta_N. \quad (39)$$

mit $\lim \alpha_N = \lim \beta_N = 0$ und, um NA zu erhalten, dass

$$E[\xi_i^N] = r_N. \quad (40)$$

Außerdem gelte

$$\sigma_N^2 := \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \text{Var}(\xi_i^N) \rightarrow \sigma^2 \in (0, \infty). \quad (41)$$

Für den Beweis verwenden wir folgende Version des zentralen Grenzwertsatzes.

Theorem 42 (Zentraler Grenzwertsatz). Seien Y_1^N, \dots, Y_N^N Zufallsvariablen auf $(\Omega_N, \mathcal{F}_N, P_N)$, so dass Y_1^N, \dots, Y_N^N unabhängig sind und (jeweils für $N \rightarrow \infty$)

- (i) $\sum_{k=1}^N E_N[Y_k^N] \rightarrow \mu$,
- (ii) $\sum_{k=1}^N \text{Var}[Y_k^N] \rightarrow \sigma^2$,
- (iii) Es gibt eine Nullfolge $(\gamma_n) \rightarrow 0$, so dass $P_N(|Y_k^N| \leq \gamma_N) = 1$ für alle $N \geq 1$.

Dann folgt, dass

$$\sum_{k=1}^N Y_k^N \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Aus dem zentralen Grenzwertsatz erhalten wir dass die Logarithmen des Aktienkurses gegen eine Brownsche Bewegung konvergieren, der Aktienkurs als gegen eine geometrische Brownsche Bewegung.

Satz 43. Unter (37) - (41) gilt

$$S_T^N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\xi\right), \quad (44)$$

wobei $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Beweis. Wir bezeichnen $Z^N := \log(\prod_{k=1}^N (1 + \xi_k^N))$. Aus der Taylorentwicklung erhalten wir, dass

$$\log(1 + x) = x - \frac{1}{2}x^2 + x^2\rho(x),$$

wobei $\rho(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Aus Annahme (39) erhalten wir, dass

$$Z^N = \sum_{k=1}^N \left(\xi_k^N - \frac{1}{2}(\xi_k^N)^2 \right) + \Delta_N$$

mit $|\Delta_N| \leq \delta(\alpha_N, \beta_N) \left(\sum_{k=1}^N (\xi_k^N)^2 \right)$; hierbei ist $\delta(\alpha, \beta)$ eine Funktion so dass $\delta(\alpha, \beta) \rightarrow 0$ falls $\alpha, \beta \rightarrow 0$. Nun gilt

$$E[|\Delta_N|] \leq \delta(\alpha_N, \beta_N) \left(\underbrace{\sum_{k=1}^N \text{Var}(\xi_k^N)}_{\rightarrow \sigma^2 T} + \sum_{k=1}^N \underbrace{(E[\xi_k^N])^2}_{=r_N} \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Wir verifizieren die Annahmen für den zentralen Grenzwertsatz:

Setzen wir $Z'_N := \sum_{k=1}^N [\xi_k^N - \frac{1}{2}(\xi_k^N)^2]$, so ist

$$\begin{aligned} E[Z^N] &= \sum_{k=1}^N (r_N - \frac{1}{2}(\text{Var}(\xi_k^N) + (r_N)^2)) \\ &= Nr_N - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \text{Var}(\xi_k^N) + Nr_N^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} rT - \frac{1}{2}\sigma^2 T \\ \text{Var}[Z'_N] &= \sum_{k=1}^N [\text{Var}(\xi_k^N) + \frac{1}{4} \text{Var}[(\xi_k^N)^2] + 2 \text{Cov}[\xi_k^N, (\xi_k^N)^2]] \rightarrow \sigma^2 T, \end{aligned}$$

da für jedes $p > 2$ $\sum_{k=1}^N E[(\xi_k^N)^p] \leq \gamma_N^{p-2} \sum_{k=1}^N E[(\xi_k^N)^2]$ gilt wegen $|\xi_k^N| \leq \gamma_N = \max(|\alpha_N|, |\beta_N|)$. Weiterhin ist:

$$|\xi_k^N - \frac{1}{2}(\xi_k^N)^2| \leq \gamma_N + \frac{1}{2}\gamma_N^2.$$

und die Behauptung folgt aus Theorem 3. □

Europäische Optionen

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit europäischen Optionen (Call- und Put-Optionen). Da wir hier von einem verallgemeinerten Begriff einer Option ausgehen, nennt man diese manchmal auch (Europäische) bedingte Ansprüche.

Definition 45. Eine nicht-negative \mathcal{F}_T -messbare Zufallsvariable C heißt *europäische Option*. Sie heißt *Derivat*, falls sie messbar ist bezüglich $\sigma(S_t^i, 0 \leq i \leq d, 0 \leq t \leq T)$.

Beispiel 46 (Europäischer Call und Put). Die klassischen Beispiele sind der Europäische Call, das Recht eine Aktie S^k an T für den Preis K zu kaufen. Sie hat an T den Wert

$$(S_T^k - K)^+.$$

Das Verkaufsrecht heist Europäischer Put und hat analog den Wert $(K - S_T^k)^+$.

Beispiel 47 (Barrier-Optionen). Eine *Barrier-Option* ist eine Option, deren Auszahlung davon abhängt, ob der Aktienkurs eine Barriere durchbrochen hat oder nicht:

- *Down-and-out*: $(S_T^k - K)^+ 1_{\{\min_{0 \leq i \leq T} S_i^k > B\}}$,
- *Down-and-out*: $(S_T^k - K)^+ 1_{\{\min_{0 \leq i \leq T} S_i^k > B\}}$,

Wir setzen $H := \frac{C}{S_T^0}$ für die diskontierte Anzahlung von der Europäischen Option C and T .

Definition 48. Die Europäische Option C heißt *replizierbar* oder *erreichbar*, falls eine selbstfinanzierende Handelsstrategie $\bar{\theta}$ gibt, so dass

$$C = \bar{\theta}_T \cdot \bar{S}_T, \quad P - \text{f.s.}$$

$\bar{\theta}$ heißt *Replikationsstrategie*.

Das ist äquivalent zur Replizierbarkeit in diskontierten Ausdrücken, (H) . Wir erhalten folgende Aussage.

Satz 49. Sei H erreichbar. Dann ist

- (i) $E_Q[H] < \infty$, für alle $Q \in \mathcal{M}_e$,
- (ii) für jeden Wertprozess V einer Replikationsstrategie gilt:

$$V_t = E_Q[H \mid \mathcal{F}_t] \quad \forall Q \in \mathcal{M}_e.$$

Man beachte, dass links und rechts sehr unterschiedliche Ausdrücke stehen: die linke Seite hängt nicht von Q ab, die rechte Seite hängt nicht von der Replikationsstrategie θ ab.

Beweis. Nach Satz 15 ist V ein Q -Martingal, also $V_0 < \infty$, und $V_0 = E_Q[H]$, somit folgt (i).

Für (ii) beobachte man, dass $E_Q[H \mid \mathcal{F}_t]$ nicht von φ abhängt, aber

$$V_t = E_Q[V_T \mid \mathcal{F}_t] = E_Q[H \mid \mathcal{F}_t]$$

ist. □

Definition 50. Eine Zahl π heißt *arbitragefreier Preis von H* , falls es einen adaptierten stochastischen Prozess X^{d+1} gibt mit

- (i) $X_0^{d+1} = \pi$,
- (ii) $X_t^{d+1} \geq 0, t = 0, \dots, T$,
- (iii) $X_T^{d+1} = H$ P-f.s..

und der Markt (X^1, \dots, X^{d+1}) arbitragefrei ist.

Wir bezeichnen die *Menge der arbitragefreien Preise* mit $\pi(H)$ und setzen

$$\pi_{\inf}(H) := \inf \pi(H) \quad \text{und} \quad \pi_{\sup}(H) := \sup \pi(H).$$

Man beachte, dass π und somit $\pi(H)$ in Einheiten des Numéraires formuliert wurde.

Satz 51. Es gelte (NA) und H sei eine Europäische Option. Dann ist $\pi(H) \neq \emptyset$ und $\pi(H) = \{E_Q[H] : Q \in \mathcal{M}_e\}$. Es folgt, dass

$$\pi_{\inf}(H) = \inf_{Q \in \mathcal{M}} E_Q[H] \quad \text{und} \quad \pi_{\sup}(H) = \sup_{Q \in \mathcal{M}} E_Q[H].$$

Beweis. (Zweiter Teil der Aussage) $\pi_{\inf}(H) = \inf_{Q \in \mathcal{M}_e} E_Q[H]$ ist klar.

Für π_{\sup} gehen wir wie folgt vor: **Ang.:** $Q^\infty \in \mathcal{M}_e$ und $E^{Q^\infty}[H] = \infty$. Wir zeigen, dass für jedes $c > 0$ ein $\pi \in \pi(H)$ existiert, so dass $\pi > c$, also $\pi_{\sup}(H) = \infty = \sup_{Q \in \mathcal{M}_e} E_Q[H]$. Wir wählen ein n , so dass $\pi' = E^{Q^\infty}[H \wedge n] > c$ und setzen:

$$X_t^{d+1} := E^{Q^\infty}[H \wedge n \mid \mathcal{F}_t].$$

Dann ist Q^∞ EMM zu (X^1, \dots, X^{d+1}) . Dieser Markt erfüllt also (NA). Dann können wir Q^∞ als P verwenden und erhalten durch das FTAP ein $Q \sim Q^\infty, Q \in \mathcal{M}_e$, was wir so wählen können, dass $E_Q[H] < \infty$. Dann ist: $\pi = E_Q[H] \in \pi(H)$ und es gilt:

$$\pi = E_Q[H] \geq E_Q[H \wedge n] = E_Q[X_T^{d+1}] = x_0^{d+1} = E^{Q^\infty}[H \wedge n] = \pi' > c.$$

□

Satz 52. Sei H diskontierte Europäische Option.

- (i) Ist H erreichbar, so ist $\pi(H) = \{V_0\}$ und $\{V_0\}$ ist der anfängliche Wert der Replikationsstrategie.

(ii) Ist H nicht erreichbar, so ist $\pi(H) = (\pi_{\inf(H)}, \pi_{\sup(H)})$.

Am Markt werden oft andere Einschränkungen als die NA Einschränkungen verwendet, z.B. sogenannte Good-Deal Bounds oder Statistical Arbitrages. (Wir suchen z.B. nach einer Klasse von W -Maßen, die uns dabei helfen soll, profitabel zu handeln).

Beispiel 53 (Die Black-Scholes-Formel). Als das bekannteste Beispiel für die Bewertung einer Europäischen Option ist die berühmte Formel von Fisher Black und Myron Scholes zur Bewertung eines Europäischen Calls zu sehen. Ein Europäischer Call ist das Recht, die zugrundeliegende Aktie an dem zukünftigen Zeitpunkt T (Maturity, Maturität) zu dem vorab vereinbarten Preis K (Strike) zu kaufen.

Da es sich um ein Recht handelt, ist der Wert immer größer oder gleich null. Wir erhalten die Auszahlung an T

$$(S_T - K)^+ = \max\{S_T - K, 0\}.$$

Durch die risikoneutrale Bewertungsformel können wir einen Preis bestimmen. Nehmen wir also an, wir befinden uns im Kontext von (44), es gilt also unter einem äquivalenten Martingalmaß Q , dass

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T\right),$$

mit $W_T \sim \mathcal{N}(0, T)$. Dann ist der Preis des Europäischen Calls gegeben durch

$$\pi^{\text{Call}} = E_Q[e^{-rT}(S_T - K)^+].$$

Diesen Erwartungswert können wir ausrechnen und erhalten

$$\pi^{\text{Call}} = S_0 \Phi(d_1) - Ke^{-rT} \Phi(d_2), \quad d_{1/2} = \frac{\log \frac{S_0}{Ke^{-rT}} \pm \frac{\sigma^2 T}{2}}{\sigma \sqrt{T}}. \quad (54)$$

Zur Berechnung gehen wir wie folgt vor: Wir definieren

$$\alpha := \frac{e^{-rT}}{\sqrt{2\pi\sigma^2 T}}, \quad \mu := \ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \quad \tilde{\sigma} := \sigma\sqrt{T},$$

und erhalten

$$\begin{aligned} E_Q[e^{-rT}(S_T - K)^+] &= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} (e^x - K)^+ \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\tilde{\sigma}^2}\right) dx \\ &= \underbrace{\alpha \int_{\ln K}^{\infty} e^x \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\tilde{\sigma}^2}\right) dx}_{=: I_1} - K \underbrace{\alpha \int_{\ln K}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\tilde{\sigma}^2}\right) dx}_{=: I_2}. \end{aligned}$$

Wir berechnen im folgenden das Integral I_1 . Durch eine quadratische Ergänzung stellt man den Integranden als Produkt einer Normalverteilungsdichte und eines variablenfreien Korrekturterms dar. Der Integrand von I_1 hat die Form $\exp(\lambda(x))$ mit

$$\begin{aligned}\lambda(x) &= x - \frac{(x - \mu)^2}{2\tilde{\sigma}^2} = -\frac{2\tilde{\sigma}^2 x + x^2 - 2\mu x + \mu^2}{2\tilde{\sigma}^2} \\ &= -\frac{(x - (\mu + \tilde{\sigma}^2))^2 + (\mu^2 - (\mu + \tilde{\sigma}^2)^2)}{2\tilde{\sigma}^2} \\ &= -\frac{(x - (\ln S_0 + (r + \frac{\sigma^2}{2})T))^2}{2\sigma^2 T} + (\ln S_0 + rT),\end{aligned}$$

wobei man die letzte Gleichheit durch einsetzen von $\mu + \tilde{\sigma}^2 = \ln S_0 + (r + \frac{\sigma^2}{2})T$ und $\frac{(\mu + \tilde{\sigma}^2)^2 - \mu^2}{2\tilde{\sigma}^2} = \mu + \frac{\tilde{\sigma}^2}{2} = \ln S_0 + rT$ erhält. Unter Beachtung von $\alpha e^{\ln S_0 + rT} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 T}} S_0$ folgt

$$I_1 = \frac{S_0}{\sqrt{2\pi\sigma^2 T}} \int_{\ln K}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x - (\ln S_0 + (r + \frac{\sigma^2}{2})T))^2}{2\sigma^2 T}\right) dx. \quad (55)$$

Betrachten wir $\tilde{Z} \sim \mathcal{N}(\ln S_0 + (r + \frac{\sigma^2}{2})T, \sigma^2 T)$, dann ist $\frac{\tilde{Z} - \ln S_0 - (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ und Gleichung (55) lässt sich schreiben als

$$\begin{aligned}I_1 &= S_0 Q(\tilde{Z} > \ln K) \\ &= S_0 Q\left(\frac{\tilde{Z} - \ln S_0 - (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} > \frac{\ln K - \ln S_0 - (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\ &= S_0 Q\left(\frac{\tilde{Z} - \ln S_0 - (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} > -d_1\right) \\ &= S_0(1 - \Phi(-d_1)) = S_0\Phi(d_1),\end{aligned}$$

wobei man die Symmetrieeigenschaft der Standardnormalverteilung ausnutzt. Die Berechnung von Integral I_2 geht analog, hier kann sogar auf die quadratische Ergänzung verzichtet werden.

Literaturverzeichnis

- [1] Beatrice Acciaio, Julio Backhoff, and Gudmund Pammer. Quantitative fundamental theorem of asset pricing. 2022.
- [2] Patrick Billingsley. *Probability and Measure*. Wiley, 3 edition, 1995.
- [3] H. Föllmer and A. Schied. *Stochastic Finance*. Walter de Gruyter, Berlin, 2011.
- [4] D. Werner. *Funktionalanalysis*. Springer, 2000.